

ワクチン接種スケジュール (2026年4月1日～)

接種時期、回数について、詳細は、定期接種実施要領、添付文書をご確認ください。
海外渡航用ワクチン等は除外しています。

分類	ワクチン	主な商品名	[会社名]	投与方法	1歳未満											1歳以上																				
					1カ月	2カ月	3カ月	4カ月	5カ月	6カ月	7カ月	8カ月	9カ月	10カ月	11カ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳
生	ロタウイルス	ロタテック (5価)	[MSD]	経口	①②③	①は生後2か月～出生14週6日後までに完了 ①-②-③の間は各々27日以上																														
		ロタリクス (1価)	[GSK]	経口	①②	①は生後2か月～出生14週6日後までに完了 ①-②の間は27日以上																														
不活化	B型肝炎	ビームゲン	[KMバイオロジクス-MeijiSeika]	皮下	①②③	①-②の間は27日以上 ①-③の間は139日以上																														
		ヘプタバックス-II	[MSD]	皮下	①②③	①-②の間は各々27日以上 ④は1歳以降、③-④の間は60日以上											原則として20価ワクチンを使用 ただし、当面の間15価ワクチンも使用可																			
不活化	肺炎球菌 (小児)	プレヘナ-20 (20価)	[ファイザー]	皮下または筋肉内	①②③④	①-②-③の間は各々27日以上 ④は1歳以降、③-④の間は60日以上																														
		バクニバンス (15価)	[MSD]	皮下または筋肉内	①②③④	①-②-③の間は各々20日以上 (標準:20~56日) ③-④の間は6か月以上 (標準:6~18カ月)											任意接種だが、日本小児科学会は、百日咳予防を目的に2種混合の代わりに3種混合を接種してもよいとしている																			
不活化	5種混合 (DPT-IPV-Hib)	クイントバック	[KMバイオロジクス-MeijiSeika]	皮下または筋肉内	①②③④	①-②-③の間は各々20日以上 (標準:20~56日) ③-④の間は6か月以上 (標準:6~18カ月)																														
		ゴービック	[阪大微研-田辺ファーマ]	皮下	①②③④	1期はDPT-IPV-Hib、DPT、DTから選択可能 原則として同一のワクチンを必要回数接種 (D:ジフテリア、P:百日咳、T:破傷風)											任意接種だが、日本小児科学会は、就学前の百日咳抗体価低下を受けて就学前の追加接種を推奨																			
不活化	3種混合 (DPT)	トリビック	[阪大微研-田辺ファーマ]	皮下	①②③④	①-②-③は各々20~56日 ③-④は6か月以上											任意接種だが、日本小児科学会は、ポリオの抗体価が減衰する前に就学前の接種を推奨																			
		DTビック	[阪大微研-田辺ファーマ]	皮下	①②③④	任意接種だが、日本小児科学会は、ポリオの抗体価が減衰する前に就学前の接種を推奨											2期 ①																			
不活化	2種混合 (DT)	DTビック	[阪大微研-田辺ファーマ]	皮下	①②③④	任意接種だが、日本小児科学会は、ポリオの抗体価が減衰する前に就学前の接種を推奨											2期 ①																			
		イモバックスポリオ	[サノフィ]	皮下	①												任意接種だが、日本小児科学会は、ポリオの抗体価が減衰する前に就学前の接種を推奨																			
不活化	Hib (ヒブ)	アクトヒブ	[サノフィ]	皮下	①②③④	①-②-③の間は各々27日以上 (標準:27~56日) ③-④の間は7か月以上 (標準:7~13カ月)																														
		乾燥BCGワクチン	[日本BCG]	経皮	①																															
生	MR (麻しん、風しん)	乾燥弱毒麻しん風しん混合ワクチン	[武田]	皮下	①②	①-②の間は3か月以上 (標準:6~12カ月)											※1 接種期間の特例 (2027年3月31日まで) 2024年度の定期接種対象者のうち、ワクチンの偏在等により接種できなかった市町村長が認める者 ・《1期》2024年度内に生後24カ月に達する又は達した者 ・《2期》2024年度において小学校就学前の5歳以上7歳未満の者 ・1962年4月2日～1979年4月1日生まれの男性であって、2024年度までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な者 (2025年度以降に抗体検査を実施した者は対象外)																			
		はしか風しん混合生ワクチン	[第一三共]	皮下	①②	小学校就学前の1年間にある者																														
生	風しん	乾燥弱毒風しんワクチン	[武田]	皮下	①②	①-②の間は3か月以上 (標準:6~12カ月)																														
生	麻しん	乾燥弱毒麻しんワクチン	[武田]	皮下	①②	①-②の間は3か月以上 (標準:6~12カ月)																														
不活化	日本脳炎	エンセバック	[KMバイオロジクス-MeijiSeika]	皮下	①②③④	①-②の間は6日以上 (標準:6~28日)、②-③の間は6か月以上 (標準:おむね1年)											2期 ④																			
		ジェービックV	[阪大微研-武田, 田辺ファーマ]	皮下	①②③④	①-②の間は6日以上 (標準:6~28日)、②-③の間は6か月以上 (標準:おむね1年)											2期 ④																			
不活化	RSウイルス (母子免疫)	アプリスボ	[ファイザー]	筋肉内	対象者: 妊娠28週～37週に至るまで (妊娠28週0日～36週6日) の妊婦 接種回数: 1回																															
		シルガード9 (9価)	[MSD]	筋肉内	対象者: 女性 (小学校6年生～高校1年生相当)	2回接種 (1回目の接種が15歳未満の場合に限る): ①-②の間は6カ月 (標準的な接種ができない場合: ①-②の間は5カ月以上)											①②																			
不活化	HPV (ヒトパピローマウイルス)	シルガード9 (9価)	[MSD]	筋肉内	対象者: 男性 (9歳以上)	3回接種: ①-②の間は2カ月、①-③の間は6カ月 (標準的な接種ができない場合: ①-②の間は1カ月以上、②-③の間は3カ月以上)											①②③																			
		ガーダシル (4価)	[MSD]	筋肉内	対象者: 男性 (9歳以上)	2回接種 (1回目の接種が15歳未満の場合に限る): ①-②の間は6か月～12か月 (当該方法ができない場合: ①-②の間は5か月以上)											3回接種: ①-②の間は2カ月、①-③の間は6カ月 (当該方法ができない場合: ①-②の間は1カ月以上、②-③の間は3か月以上)																			
生	おたふくかぜ	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	[武田]	皮下	①②	①は1歳を過ぎたら早期に接種											日本小児科学会は2回接種を推奨 ②は5歳以上7歳未満の小学校入学前1年間を推奨																			
		おたふくかぜ生ワクチン	[第一三共]	皮下	①②	①は1歳を過ぎたら早期に接種											日本小児科学会は2回接種を推奨 ②は5歳以上7歳未満の小学校入学前1年間を推奨																			

定期接種の対象年齢 (標準的な接種時期を逃した児に対するキャッチアップ等は除く) 任意接種の対象年齢 定期接種実施要領の標準的な接種時期の目安 (数字は初回からの接種回数) 日本小児科学会推奨の接種時期 (数字は接種回数)

* 異なる種類の注射の生ワクチン同士の接種間隔は27日以上